

# Une nouvelle menace sur la châtaigneraie !



*Le CYNIPS*



**aux portes du Sud Ouest**

Les attaques de cynips provoquent une **forte diminution de la croissance des arbres et des pertes considérables de productions fruitières**. Dès l'émergence des adultes de fin mai à début juillet, les femelles pondent aussitôt dans les bourgeons latents et verts situés à l'aisselle des feuilles de la pousse de l'année. Chaque femelle, pond une centaine d'œufs à raison de 3 à 5 œufs par bourgeon.

Les œufs éclosent au bout de 30 à 40 jours et les larves débutent leur croissance dans les bourgeons infestés durant l'été et le début de l'automne. Le développement des jeunes larves cesse durant la fin de l'année et l'hiver. Les larves reprennent leur croissance au moment du **débourrement des jeunes bourgeons** et induisent la formation de **galles**. Après 20 à 30 jours de développement dans les bourgeons, les jeunes larves se nymphosent et les jeunes adultes s'envolent.

## Précautions à prendre :

**Ne pas importer de plants d'origine inconnue**  
**Ne pas acheter de plants ni de greffons en provenance des zones infestées**  
**Éviter la multiplication de matériel végétal sans connaître l'origine**



**SI VOUS DETECTEZ UN SYMPTOME DE CYNIPS  
APPELEZ IMMEDIATEMENT**

**INVENIO Douville 05 53 81 94 32**

Ou

SRAL Aquitaine:	05 56 00 42 03
SRAL Poitou-Charentes :	05 49 00 84 40
SRAL Limousin:	05 55 12 92 50
SRAL Midi-Pyrénées :	05 61 10 62 62